

| | | مرحله رشدی آفت | | | | طول نسل | تعداد نسل | نام علمی | نام آفت | | |
|--|-------|----------------|------|--------------|----------|--------------------|----------------------|-----------|--------------|--------|--|
| زمستان | پائیز | تابستان | بهار | | | | | | | | |
| | | | | تمام طول سال | چند نسلی | Ceratitis capitata | مگس میوه مدیترانه ای | شکل شناسی | زمستانگذرانی | | |
| سفید- کشیده و بطور موازی در میوه | | | | | | | | | تخم | | |
| سفید با سر باریک | | | | | | | | | لارو(پوره) | | |
| استوانه ای بطول ۳ میلیمتر، برنگ قهوه ای مایل به قرمز | | | | | | | | | شفیره | | |
| روی شاخک یک موی حنایی- پشت سینه دارای نقوش سیاه و سفید- روی بال سه نوار تیره بشکل ۱۱۸- | | | | | | | | | بالغ | | |
| خاک | | | | | | | | | محل | | |
| شفیره با حشره بالغ | | | | | | | | | نحوه | | |
| تخمهای بصورت دستجات ۷۸-۲۲ عددی زیر پوست میوه | | | | | | | | | محل / نحوه | | |
| پریکارپ میوه | | | | | | | | | محل | خسارت | |
| لارو | | | | | | | | | نحوه | | |
| شخم عمیق در زمستان | | | | | | | | | زراعی | | |
| مکانیکی | | | | | | | | | | | |
| ایجاد نر عقیمی- استفاده از طعمه مسموم پروتئین هیدرولیزات و مالاتیون | | | | | | | | | بیولویک | مبارزه | |
| دوبار سمپاشی با گوزاتیون ۲در هزار به فاصله ۱۵ روز | | | | | | | | | شیمیابی | | |
| ایجاد قرنطینه- یخنداش و سرمای متناسب زمستانی بیش از ۱۰۰ روز | | | | | | | | | طبیعی | | |