



### برنامه غذایی درختان میوه دانه دار و هسته دار

مرحله رشدی	نوع کود	روش مصرف (محل‌پاشی)	توضیحات
ظهور برگ‌های جدید (اولیه)	با ما تماس بگیرید	با ما تماس بگیرید	تقویت درخت در اوایل شروع فصل رشد
تورم جوانه‌ها (صورتی شدن جوانه‌ها)	با ما تماس بگیرید	با ما تماس بگیرید	جهت تولید جوانه‌های محکمتر و بهتر
قبل از شروع گلدهی	با ما تماس بگیرید	با ما تماس بگیرید	جهت حفظ درصد بالا از گلها و تبدیل به میوه
میوه دهی	با ما تماس بگیرید	با ما تماس بگیرید	بالا بردن کیفیت میوه
یکماه تا ۲ هفته قبل از برداشت	با ما تماس بگیرید	با ما تماس بگیرید	جهت استحکام بافت میوه و ماندگاری در انبار
بعد از برداشت میوه	با ما تماس بگیرید	با ما تماس بگیرید	تقویت درخت بعد از برداشت نقش مهمی در میزان باردهی در سال بعد و همچنین مقاومت درخت در برابر سرمازدگی

آدرس: استان تهران- شهرستان دماوند- آبسرد- خیابان شهید فهمیده - جنب مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی آبسرد - آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری‌های گیاهی آبسرد



آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماری های گیاهی آبسرد  
دارای مجوز رسمی سازمان نظام مهندسی و جهاد کشاورزی استان تهران  
پروانه بهره برداری: ۸۷/۴/۲۰۴۳

توجه:

\*\*\* در مرحله گل هیچوقت محلولپاشی نشود.

\*\*\* یک ماه قبل از برداشت به هیچ عنوان ازت به درخت داده نشود.

\*\*\* تقویت درختان میوه بهتر است بعد از برداشت میوه شروع شده و تا قبل از برداشت میوه سال بعد ادامه یابد.

\*\*\* آهن برای درختان در ۳ مرحله ، شروع فصل رشد (۳۰ gr برای هر درخت)، شروع باردهی (۴۰ gr برای هر درخت) و باردهی کامل (۵۰ gr برای هر درخت) استفاده میشود.

آدرس: استان تهران- شهرستان دماوند- آبسرد- خیابان شهید فهمیده - جنب مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی آبسرد - آزمایشگاه تشخیص آفات و بیماریهای گیاهی آبسرد

[www.arvin-agri.com](http://www.arvin-agri.com)

email: [info@arvin-agri.com](mailto:info@arvin-agri.com)

تلفن: ۰۲۱-۷۶۳۷۴۱۴۴